福井県の甲虫（3）

井崎市左エ門

昨年には同好者が殖え、珍種を採集して寄贈を受けて、錦上花を飾る事が出来た事を祝福したい。主なものを上げると、上中学校の川島先生のオオオビハナノミ、味真野の福田久義氏のミツノゴミムシダマシ、オオヒラタエンマムシ、ベニモンテビオオキノコムシ、武生高校生坂永泰生君のクチキクシヒゲムシ、オオチャイロハナムグリ、カタジロゴマフカミキリ等の外には産地の次に氏名を記して感謝の意を表します。以前発表ずみの科のものは、追加としてまとめて発表したい。尚和名の新称は中根猛彦先生の命名に依る。

Authicidae　いつかくちゅう科

304　Anthicus marseuli Pic　アカモンイツカク　味真野（福田久美）
小形種で、採集は困難である。

Cerambycidae　かみきりむし科
長くて翅鞘の固いものが多く、種類は多く今後も殖える事と思われる。幼虫は樹幹に食い入って害するものが多く、シロスジカミキリの幼虫がウマノオバチの寄生を受ける事は有名である。

305　Spandylis buprestoides Linné　クロカミキリ　遠敷
中形種で胸部は丸形に近く、稍小形で黒い。

306　Eurypoda batesi Gahan　ベーツヒラタカミキリ　西津（小浜中高田ヤス子）下根来。茶褐色で扁平、大腿は大きく、クワガタの或種に似て居る。

307　Megopis sinica White　ウスバカミキリ　遠敷、小浜市府中（若高小田俊博）

308　Prinus insularis Motschulsky　ノコギリカミキリ　遠敷、鳩ヶ湯
黒色扁平種で前胸の両側に2個の鋸歯状突起がある。

309　Psephactus remiger Harold　コバネカミキリ　武生（丸山博己）鳩ヶ湯。茶褐色で前翅は小さく腹背の半位、燈火に来るが稀。

310　Distenia gracilis Bfessig　ホソカミキリ　鳩ヶ湯

311　Stenocorus coeruleipennis Bates　フタコバルリカミキリ　平泉寺（旭校 鶏飼斉）　翅鞘は黒藍色で美しいが稀。

312 Toxotus minutus reini Heydon　モモグロハナカミキリ　鳩ヵ湯

以下のハナカミキリ類は花上に得られるが、少いものの様である。

313 Lemula decipiens Bates　アカチビハナカミキリ　神宮寺、五分市（武生高坂永泰生）　赤褐色の小形種である。

314 Gaurotes ussuriensis doris Bates　カラカネハナカミキリ　木根橋（鵜飼）鬼ヵ谷

315 Omphalodera puziloi Solsky　フタオビハナカミキリ　遠敷

316 Leputura succedanea Lewis　アカハナミキリ　福井（坪田）

317 Leputura dentatipennis Pic　ヒゲジロハナカミキリ　武生（武生一中）下根来（ねごり）

318 Leputura adumensis Matsushita et Tamanuki　ミヤマルリハナカミキリ　小浜市門前

319 Leputura excavata Bates　ミヤマクロハナカミキリ　木根橋（旭校鵜飼）

320 Leputura latipennis Matsushita　ハネビロハナカミキリ　小浜市志野、下根来

321 Leputura aethiops dimorpha Bates　ムネアカクロハナカミキリ　遠敷、鳩ヵ湯

黒色で♀の前胸背が赤い、色々の花に来るが少ない。

322 Anoplodera scotodes Bates　ツヤケシハナカミキリ　武生（坂永）

323 Anoplodera pyrrha Bates　ヒメアカハナカミキリ　五分市（坂永）

324 Pidonia yamato Hayashi et Mizuno　ヤマトヒメハナカミキリ　小浦（旭校鵜飼）

325 Rhymatodes afbicinctus Bates　シロオビハナカミキリ　遠敷、平泉寺（鵜飼）

326 Stranagalia duodecimgutata Fabricius　キモンハナカミキリ　平泉寺（鵜飼）

327 Stronagalia arcuata tenuicornis Motschulsky　ツマグロハナカミキリ　遠敷、鬼ケ谷

5月頃ツツジの花にて得られる。稍多い方。

328 Stronagalia ochraceofasciata Motschulsky　ヨツスジハナカミキリ　和泉村大谷、遠敷

329 Stronagalia regalis Bates　オオヨツスジハナカミキリ　小浜（小浜中畑木文枝）

前両種は共に山間の種々の花上にて得られるが、少ない。黒化せるものも得られる。

330 Strangalina contracta Bates　ミヤマホソハナカミキリ　鬼ヵ谷

331 Oedecmema dubia Fabricius　モモブトハナカミキリ　鳩ヵ湯

332 Stenhomalus cleroides Bates　カツコウメダカカミキリ　三方町小川（若狭長谷川）

333 Stenygrinum quadrinotatum Bates　ヨツボシカミキリ　鳩ヵ湯

早春新に集まる。

334 Aciotes sanguinipennis Blessig　チョウセンベニカミキリ　オタ（林正之）

ムモンベニカミキリとも云い、稀なものらしい。

335 Alloiraeus sphaerionides Bales トビイロカミキリ 平泉寺（鵜飼）

336 Xystrocera globosa Olivier アオスジカミキリ 遠敷、鳩ヵ湯

♀、♂ 月頃灯火に飛来する。普通種である。

337 Mallambyx raddei Blessig ミヤマカミキリ 遠敷、鳩ヵ湯

黄褐色の大形種で、前胸の両側に突起がないのでクワカミキリと区別出来る。

338 Pyrestes haematicus Pasceo クスベニカミキリ 福井（鵜飼）下根来

339 Chcoridorum thaliodes Bates オオアオカミキリ 下根来、福井（坪田）

340 Leontium viride Thomson ミドリカミキリ 鬼ヵ谷、鳩ヵ湯

両種共に細長く、緑色で金属光沢が有る。山地にて採集出来る。後者の方が少し多い。

341 Rosario batesi Harold ルリボシカミキリ 鳩ヵ湯、上池田（武生東小学校）

觸角の関節の所が太い美麗種で、山間の薪にて得られる。

342 Semanotus japonicus Lacordaire スギカミキリ 鬼ヵ谷

黒褐色の翅鞘に四ケの黄紋が有る。山地で獲れるが少ない。

343 Callidium rufipenne Motschulsky ヒメスギカミキリ 福井（坪田）神宮寺

四、五 月頃に多く、色彩に変化が多い。

344 Xylotrechus chinensis Chevrolat トラフカミキリ 鳩ヵ湯

幼虫は桑の害虫で、桑園で得られるが少ない。

345 Xylotrechus cuneipennis kraatz ウスイロトラカミキリ 鳩ヵ湯

346 Xylotrechus rufilius Harold クビアカトラカミキリ 五分市（坂永）

347 Xylotrechus pyrrhoderus Bates ブドウトラカミキリ 遠敷（上田博）

両種共に前胸部赤くて美しい。

348 Cyrtoclytus caproides Bates キスジトラカミキリ 下根来 鳩ヵ湯（鵜飼）

349 Perissus kiusiuensis Ohbayashi キウシウチビトラカミキリ 鬼ヵ谷

350 Chlorophorus annularis Fabricius タケトラカミキリ 石徹白

351 Chlorophorus japonica Cherolat エクリトラカミキリ 遠敷、大野（福井昇）

クロトラカミキリとも云う。夏日飛翔するが少ない。

352 Chlorophorus notabilis Pasceo キイロトラカミキリ 遠敷、鳩ヵ湯

黄色に淡黒条が有る。四月頃から民家へ来るが、夏日萩を積んだ所に多数集合する。

353 Chlorophorus diadema inhissutus Matsushita クロトラカミキリ 鳩ヵ湯 下根来

（研）

354 Leomonox transilio Bates　トゲヒゲトラカミキリ　武生（坂永）

355 Clytus auripifis Bates　キンケトラカミキリ　越前町厨（林正之）

356 Clytus raddensis Pic　シロオビトラカミキリ　五分市（坂永）

357 Clytus melaenus Bates　シラケトラカミキリ　夏敷

358 Rhaphuma gracifipes Faldermann　ホソアシトラカミキリ　鬼カ谷

359 Rhophuma diminuta Bates　ヒメクロトラカミキリ　厨（林）、鬼カ谷

360 Nylotrechus lauchus Matsushita　ズマルトラカミキリ　武生（坂永）

361 Dere thoracica White　ホタルカミキリ　鬼カ谷

五、六月頃薪の中から多数出て来る。

362 Purpuricenus teminckii Guérin-Ménevitté　ベニカミキリ　鬼カ谷、夏敷

363 Purpuricenus spectabilis Motschulsky　ヘリグロベニカミキリ　栗野（教高昆虫班）木芳峠（同）

両種共に有名なる竹の害虫で有る。八、九月頃迄飛翔して居る。

364 Mesechthistatas binodosus meridionalis Hayashi　ミヤマコブヤハズカミキリ　越知山（林）下根来

365 Psacothea hilaris Pascoe　キボシカミキリ　小浜（若高 長谷川）

桑畑で得られるが少ない方である。

366 Dihammus fraudator Bates　ビロウドカミキリ　鳩カ湯、上宍馬

367 Dihammus luxuriosus Bates　センノキカミキリ　福井（明林中 中島一紀）石徹白

368 Mecynippus pubicornis Bates　イタヤカミキリ　鳩カ湯

369 Cypriola sejuncta Bates　ニセビロウドカミキリ　鳩カ湯

370 Monochammus grandis White　ヒゲナガカミキリ　丸岡町竹田（城東中、大川義隆）

觸角が長く、前胸背突起の後方の両側に黄褐条が有る。北方系で稀なものらしい。

371 Monochammus subfasciatus Bates　ヒメヒゲナガカミキリ　鳩カ湯

372 Monochammus tesserula White　マツノトビイロカミキリ　福井（土肥）福井（鵜飼）

373 Monochammus beroni Pic　ベロンヒゲナガカミキリ　越留山（林正之）

374 Monochammus yokoyamai Gressitt　ヨコヤマヒゲナガカミキリ　越留山（林）武生（北日野中）

ゴマダラカミキリの白紋を小さくした様な形で、本県では珍らしい。

375 Melanauster macularius Thomson　ゴマダラカミキリ　夏敷、鬼カ谷

黒色に白紋が多く、山野共に多い。

376 Rhodopin lewisi Bates　セミスジカミキリ　織田（林正之）

377 Eupromus ruber Dalman　ホシベニカミキリ　下関系

赤色に黒点が有る。南方系らしく本県にては甚だ稀に有る。

378 Melanauster macularius Thomson　ゴマダラカミキリ　遠敷、鬼ヵ谷

黒地に白点が有る普通種で、山地にも河畔にも多い。

379 Uraecha bimaculata Thomson　ヤハズカミキリ　福井（福井舞）同（坪田）

380 Batocera lineolata Chevrolato　シロスジカミキリ　小浜（長谷川）福井（坪田）

クヌギ、ホナラ等の幹に食入りて害する。県内産の内では大形である。

381 Apriosa germari japonica Thomson　クワカミキリ　大野（福井、土肥）

赤褐色でミヤマカミキリに似て前胸の両側に突起が有る。有名なる桑の害虫。

382 Mesosa longipennis Bates　ナガコマフカミキリ　遠敷、文室（坂永）

383 Mesosa myops japonica Bates　ゴマフカミキリ　石徹白

384 Mesosa senilis Bates　カタジロゴマフカミキリ　武生（丸山博己）

越留山（林）

385 Apalima litulata Chevrolat　ヒゲナガコマフカミキリ　鳩ヵ湯、知三（田中司）

386 Pterolophia annulata Chevrolat　ワモンサビカミキリ　鬼ヵ谷

387 Pterolophia rigida Bates　アトモンサビカミキリ　鬼ヵ谷

388 Pterolophio leiodopodina Bates　ナカジロサビカミキリ　福井（明倫中

中島一紀）

389 Pterolophio zonata Bates　アトジロサビカミキリ　福井（明倫中、中島紀

子）

390 Criocephalus lusticus Linné　サビカミキリ　武生（丸山博己）

391 Sydonia divaricata Bates　シラクモサビカミキリ　鳩ヵ湯

392 Lacon furiginosus Chandeze　ホソサビカミキリ　文室（坂永）

393 Arhopalas unicolor Gahan　ツシマムナクボカミキリ　武生（金子）

394 Grenea issikii Mitono　イッシキキモンカミキリ　芦見（鵜飼）

南方系の美しい小形種で、足羽郡美山村芦見で成和中学の鵜飼充君が採集したもので、西京大学の中根猛彦氏に依れば、本州にては二回目との事である。

395 Grenea relicta Pascoe　シラホシカミキリ　福井（坪田）、鳩ヵ湯

396 Paraglenea chrysochloris Bates　ハンノオオルリカミキリ　原野（敦高昆虫班

）（鵜飼充）

397 Paraglenea fortunei Saunders　ラミーカミキリ　鯖江市神明（林）

南方系の美麗種で、鯖江の旧連隊附近で織田町の林正之氏が、22年に採集せられたが、其後は採集せられぬらしい。

398 Oberea japonica Thunberg　リンゴカミキリ　福井（春山坂谷口）

永平寺（土肥）

細長く稍小形で林間に多い，其他似たものが各種有るが，ヘリグロリンゴ以外は少ない様で有る．

399 Oberea vittata Blessing ホソキリンゴカミキリ 遠敷

400 Oberea hevescens Bates ヒメリンゴカミキリ 武生，池泉（福田久美）

401 Oberea mixta Bates ニセリンゴカミキリ 池泉（坂永）

402 Nupserha marginella Bates ヘリグロリンゴカミキリ 鳩ヵ湯，鬼ヵ谷

403 Epiglenea comes Bates ヨツキボシカミキリ 栗野（敦高昆虫班）
和泉村大谷

404 Phytoecia rufiventris Ganties キクスイカミキリ 神宮寺，鬼ヵ谷

藍黒色小形で前胸の中央が赤い．有名な菊の害虫で茎に幼虫が入るとスグ折れる．

405 Asaperda rufipes Bates キクスイモドキカミキリ 下根来

406 Chreonoma fortunei japonica Gahan ルリカミキリ 遠敷

小形の美麗種であるが稀で有る．

407 Pseudaeolesthes chrysothrix Bates キマダラカミキリ 大野（福井昇）

408 Rhopaloscerus bifasciatus Blessig ヒトオビアラゲカミキリ 武生
（丸山博巳）

409 Pogonocherus dimidiotus kraatz ネジロカミキリ 武生（斎藤真弘）

410 Atimura japonica Bates コブスジサビカミキリ 文室（坂永）

411 Eryssamena saperdina Bates トゲバカミキリ 栗野（旭校鶏飼）

412 Eutetrepha ocelota Bates ヤツメカミキリ 下根来，小浜（若高長谷川）

413 Thyestilla gebleri Fabdermann アサカミキリ 鳩ヵ湯 遠敷

414 Cagosima sanguilenta Thomson ハンノキカミキリ 下根来

415 Exocentrus fasciolatus Bates クモガタケシカミキリ 鬼ヵ谷

Bruchidae まめぞうむし科

この科の甲虫は小形で豆の内部に食い入って大害を与える．

416 Callosobruchus chinensis Linné アヅキゾウムシ 高浜（坪田）

417 Bruchus pisosum Linné エンドウゾウムシ 遠敷

418 Bruchus rufimanus Boheman ソラマメゾウムシ 遠敷

POLYPHAGA - RHYNCHOPHORA 真吻類

Anthrididae ひげながぞうむし科

この科のものは熱帯系のもので，時々灯火に来るが，発生は少ない様である。

419 Tropideres flobellicornis Sharp シリジロヒゲナガゾウムシ 鬼ヵ谷

420 Tropideres loelofsi Lewis クロフヒゲナガゾウムシ 織田（林）

421 Basitropis nitidcutus jaker マダラフトヒゲナガゾウムシ 鳩ヵ湯

422 Phlocobius gibbosus Roelofs　セマルヒゲナガゾウムシ　織田（林）
423 Coccorhinus oculatus Sharp　キノコヒゲナガゾウムシ　鳩カ湯
424 Anthribus kuwanae Yuasa　タマカイガラヒゲナガゾウムシ　鬼カ谷
5.6月頃成虫が出る．タマカイガラムシに寄生する．

Curculionidae　ぞうむし科

この科のものは翅鞘の固いものが多く．頭部は割合太いコブゾウ類や長く突出するシギゾウ類等色々な形をなすが外の甲虫類のよりも長い．種々の植物に害が有る．

425 Acicunemis palliata Pascoe　ウスモンカンキゾウムシ　織田（林）
426 Myllocerus griceus Roelofs　カシワクチブトゾウムシ　返敷
427 Myllocerus fumosus Faust　ケブカクチブトゾウムシ　鳩カ湯
428 Phyllobius armatus Roelofs　リンゴコフキゾウムシ　返敷
カシワ、コナラ等の葉上に多く、金緑色の光沢がある。山地に多い。
429 Phyllobius lewisi Sharp　ルイスヒゲボソゾウムシ　足羽山、鳩カ湯
430 Phyllobius polydrusoides Sharp　ウスイロヒゲナガゾウムシ　鬼カ谷
431 Dermatoxenus nodosus Motschulsky　ヒメシロコブゾウムシ　鬼カ谷、稲井（坪田）
432 Episomus turritus Gyllenhal　シロコブゾウムシ　返敷、稲井（坪田）
上記二種はこの科中大形のもので頭頂は広い方で有る．各種の樹幹を歩行して居る．

三方郡三方町向陽寺谷植物目録

三方郡　今井長太郎

三方郡三方町の向陽寺谷並びにその附近の植物を昭和10年以来調査しました。その結果を次に報告致します。

○暖地系統　◇中南部系統　△北方系統　□☆普通栽、外、逸等.

ハナヤスリ科
○　オオハナワラビ
□　フユノハナワラビ
コケシノブ科
○　コウヤノコケシノブ
ウラボシ科
△　クジャクシダ
□　トラノオシダ
◇　カミカモシダ
○　チャセンシダ
◇　サトメシダ
△　イヌワラビ