

## 笹が峯、金草山、冠山、夜叉池における分 分布上注意すべき植物

渡 辺 定 路

(1) これらの山地を西限としている植物

- *Polystichum* × *shin-tashiroi kurata* シロウマイノデ  
分布：冠山以北の本州、 県内では三ノ峯、経ヶ岳、冠山。カラクサイノデとサカダイノデの雑種、冠山の水場付近で採集
- *Pinus parriflora* Sieb. et zucc. var. *pentaphylla* Henry  
キタゴヨウ  
分布：北海道、本州（夜叉池以北） 県内では、三の峯、丈鏡山、浄法寺、入谷国有林、面谷、冠山、金草山、夜叉池。急斜面な尾根や母岩の露出している斜面に生育している。
- *Alnus fauriei* Leve. ミヤマカワラハンノキ  
分布：本州（今立郡池田町河内以北）の日本海沿岸の山間部、県内では、三の峯、取立山、小原峠、荒島岳、部子山、河内。川沿いや、谷沿いの湿った場所に生育している。
- *Alnus matsumurae* Call. ヤハズハンノキ  
分布：本州（夜叉池以東）特産の樹林、県内では、三ノ峯、赤兜山、経ヶ岳、鉢伏山、取立山、荒島岳、部子山、冠山、夜叉池、平家岳、屏風岳。土くずれのある不安定な斜面や、多湿でおそくまで残雪のある所にヤハズハンノキの群落が見られる。
- *Coptis trifolia* Salisb. ミツバオウレン  
分布：北海道、本州（冠山以東）の亜高山or高山、県内では三の峯、赤免山、鉢伏山、取立山、冠山
- *Coptis trifoliolata* Makino ミツバノバイカオウレン  
分布：本州（夜叉池以北の日本海沿岸地方）  
県内では、三の峯、大長山、鉢伏山、荒島岳、平家岳、笹が峯、金草山、冠山、夜叉池
- *Potentilla togasii* Onwi エチゴキジムシロ  
分布：本州（夜叉池以北の日本海沿岸地方）  
県内では三の峯、経ヶ岳、部子山、小谷堂（和泉村）、冠山、夜叉池。冠山、夜叉池のものにはキジムシロと中間形もある。またストロンを出すものもある。
- *Sanguisorba hakusanensis* Makino カライトソウ  
分布：飛騨高原の北部から裏日本を通過して三国岳まで  
県内では、三の峯、赤免山、経ヶ岳、大長山、鉢伏山、荒島岳、平家岳、部子岳、冠山、夜

叉池、丈鏡山

- *Ilex sugerokii* Maxim. var. *brevipedunculata* S.Y.Hu  
アカミノイヌツゲ  
分布：北海道、本州（夜叉池以北）の高山  
県内では、三の峯、赤免山、経ガ岳、法恩寺、大長山、鉢伏山、取立山、平家岳、荒島岳、冠山、金草山、笹ガ峰、夜叉池
- *Trautvetteria japonica* Siek. et zucc. モミジカラマツ  
分布：北海道、本州（冠山以東）の高山  
県内では、三の峯、赤免山、冠山
- *Angelica iwatensis* Kitagawa イワテトウキ  
分布：北海道、本州（夜叉池以北）  
県内では、三の峯、経ケ岳、荒島山、冠山、夜叉池、大長山
- *Tilingia holopetala* Kitagawa イブキゼリ  
分布：北海道、本州（伊吹山以北）  
県内では、三の峯、経ケ岳、荒島山、部子山、冠山、夜叉池
- *Rhododendron nipponicum* Matsum. オオバツツジ  
分布：本州（笹ガ峯以北）  
県内では、赤免山、大長山、荒島岳、笹ケ峯
- *Rhododendron albrechtii* Maxim. ムラサキヤシホ  
分布：北海道、本州（夜叉池以東）、  
県内では、白山火山地、越美山地の高所
- *Gentiana thunbergii* Griseb. var. *minor* Maxim. タテヤマリンドウ  
分布：北海道、本州（夜叉池以北）  
県内では、冠山、夜叉池
- *Samolus parviflorus* Rafim. ハイハマボウソウ  
分布：北海道、本州（近畿以東）……稀れな植物である。  
県内では、池田町河内。1970年に若杉氏採集
- *Prunella prunelliformis* Makino タテヤマウツボ  
分布：本州（冠山以北の高山）  
県内では、三の峯、経ガ岳、荒島岳、部子山、冠山。

- 
- *Hemerocallis middendorffii* Trautu. et Mey. var. *esculent*

Ohwi    ゼンテイカ

分布：北海道、本州（夜叉池以東）

県内では、白山火山地、越美山地の高所

- *Veratrum stamineum* Maxim.    コバイケイソウ

分布：北海道、本州（夜叉池以東）

県内では、白山火山地、越美山地の高所

(2) これらの山地を南東限としている植物

- *Athyrium tozanense* Hayata    シマイヌワラビ

分布：台湾、屋久島、九州（霧島山）、本州〔因幡、越前（冠山）〕

県内では冠山のみ。このようなものが、どうして冠山に生育しているのか、福井県も狭いよう  
うで広いものである。1970年、筆者が採集

(3) 表日本性の植物

- *Ptilopteris maximowiczii* Hance.    フジシダ

分布：本州（関東以西）、四国、九州等

県内では、夜叉池、冠山（岐阜県側）

- *Parabenzoin trilobum* Nakai    シロモジ

分布：本州（静岡以西）、四国、九州

県内では、和泉村、岩籠国有林、冠山

- *Diathus cercidifolius* Maxim.    マルバノキ

分布：長野、岐阜、福井、滋賀、広島、高知

県内では長野ダム以東、冠山

(3) 稀産の植物

- *Lycopodium cryptomerinum* Maxim.    スギラン

分布：日本全土

県内では冠山（下道）、三の峯（渡辺）

- *Calanthe tricarinata* Lindl.    サルメンエビネ

分布：日本全土

県内では夜叉池（林）、金草山（渡辺）青葉山（上坂）

- 
- 参考文献 奥山 春季 日本高山植物図講  
" 原色日本野外植物図譜 1～7  
大井次三郎 日本植物誌  
杉本 順一 日本草木植物総検索誌シダ篇  
福井県生物目録(昭和八年)