

新採集品報告

渡辺定路

Aspidiaceae オンダ科

Athyrium deltoidofrons Makino f. *oharae* Kurata

オゼサトメンダ

勝山市小原峠 1967. 6/18

葉の表面に細毛が散生するもの。

山形、福島、栃木、新潟、鳥取に分布。

Athyrium oblitescens Kurata サキモリイヌワラビ

遠敷郡上中町 1969. 10/26 (9269. 9270)

遠敷郡一ツ谷 1968. 10/3 (7249)

イズイヌワラビに似ているが、葉質がそれより厚く孢子も正常である。葉柄の鱗片は濃褐色～褐色。

山口県と九州に分布。

A. × pseudo-iseanum Kurata ハツキイヌワラビ

遠敷郡名田庄村一ツ谷 1968. 10/3

ホソバイヌワラビとタニイヌワラビの雑種。

三重、和歌山、鳥取の各県と九州に分布。

A. vidalis (Franch. et Savat.) Nakai

f. *yamadae* (Miyabe. et Kudo) Kurata エゾイヌワラビ

経ヶ岳 1967. 10/10 (7166)

包膜のふちに著しい歯牙がある。

Dryopteris atrata (Wall.) Ching f. *cycadina* (Fr. et Sav.) Namekata
et Kurata イヌイワヘゴ

松岡町吉野岳 1964. 6/3

葉柄基部の黒色鱗片の中に褐色のものがまじっているもの。

北海道、本州（北中部に多く、近畿、中国では稀）

Dryopteris × okudairaeoides Kurata アカメクジャク

遠敷郡名田庄村 1968. 8/17 (9194)

小浜市加斗 1971. 9/12 (11866)

イヨクジャクとノコギリシダの雑種。

両者の中間の形質を示し、独立羽片数は9~10対、子のう群の長さは5~10耗。

本州(静岡、三重、兵庫)、九州に分布。

Polyodiaceae ウラボシ科

Crypsinus veitchii (Bak.) Copland ミヤマウラボシ

経ヶ岳 1970. 7/21

北海道、本州(関東、中部、大和)、四国の高山帯に分布。

Loxogramma saziran Tagawa サジラン

遠敷郡名田庄村野鹿谷 1967. 8/24

名田庄村榎谷 1971. 5/16

本州(茨城県以西)、四国、九州、中国の暖帯の岩上や樹上に生育。

Betulaceae ハンノキ科

Betula maximowicziana Regel ウダイカンバ

大野市池ヶ原 1971. 7/29 (12162) 石本昭司採集

本州(石川、愛知県以北)、北海道の温帯に分布。市の瀬から白山に登る途中には多く自生しているが、三の峯をはじめ福井県側には今まで自生は知られていなかったが、石本先生の慧眼により発見された。岐阜県側から侵入してきたものと思われる。

Fagaceae ブナ科

Quercus mongolica Fisch.

var. *undulatifolia* Kitamura et Horikawa ミヤマナラ

冠山 1970. 8/17 (10577)

平家岳 1972. 8/5 (12068)

ミズナラの高山形

Polygonaceae タデ科

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

var. *uzenensis* Honda ケイタドリ

池田町冠山 1970. 9/23 今庄町金草山 1970. 8/23

P. filiforme Thunb. f. *albiflora* Hara ギンミズヒキ

高浜町関屋 1971. 9/12 (11823)

小浜市池の河内 1971. 9/24 (11833)

花被が白色のもの

Rumex conglomeratus Murr. ナガバギンギン

福井市南福井駅 1972. 5/26 (10775)

帰化植物

Caryophyllaceae ナデシコ科

Moehringia lateriflora (Linn.) Fenzl オオヤマフスマ

大野市巢原(平家平) 1971. 7/31

Ranunculaceae キンボウゲ科

Aconitum sanyoense Nakai サンシヨウブシ

経ヶ岳 1971. 10/3 (11746) 三の峯 1962. 8/13 (7741), 1967. 8/18(4118)

温見 1952. 8/24 (堀) (7672) 刈込池 1972. 9/24 (9736)

Isopyrum nipponicum Franch.

var. *sarmentosum* Onwi サンインシロカネソウ

美浜町栗柄谷 1971. 8/20 上中町河内 1971. 9/25 名田庄村虫鹿野 1972. 4

Thalictrum aguilegifolium Linn.

var. *sibiricum* Regel et Tiling マセンカラマツ

福井市深谷 1972. 5/28 (12172)

カラマツソウの変種で、果実は5~10個で母種より少なく、倒卵形で母種より大きい。

四国、九州(久住山)の亜高山~温帯に分布。

Thalictrum minus Linn. var. *stipellatum*

(C. A. Mey. ex Maxim.) Tamura オオカラマツ

経ヶ岳 1971. 10/3 (11755) 丈鏡山 1972. 6/11. 7/2 (9853. 9886)

三の峯 1972. 9/23 (9727)

北海道、本州(北中部)の亜高山帯~温帯の岩上に生育。

Papaveraceae ケシ科

Corydalis incisa (Thunb.) Pers. f. *pallescens* Makino シロヤブケマン

福井市更毛, 下一光 1971. 4/29 経ヶ岳 1972. 5/3

C. lineariloba Sieb. et Zucc. var. *papilligera* Ohwi キンキエンゴサク

名田庄村一ツ谷 1968. 5/3

Cruciferae アブラナ科

Brassica napus Linn. セイヨウアブラナ

福井市国鉄花堂駅 1972. 5/26

アブラナに似た帰化植物。

Cardamine dentipetala Matsum. オオケタネツケバナ

丈鏡山 1971. 5/22

本州(北中部の日本沿岸地方山地)の湿気のある林中に生育。

オオバタネツケバナに似て全体に毛があり、長角も有毛である。

Saxifragaceae ユキノシタ科

Chrysosplenium echinus Maximowicz イワネコノメソウ

遠敷郡名田庄村槇谷 1971.

葯が赤色

Hamamelidaceae マンサク科

Hamamelis japonica Sieb. et Zucc. var. *obtusata* Matsum.

f. *incarnata* (Makino) Ohwi アカバナマンサク

福井市国見岳 1971. 4/17

花卉が帯赤色のもの。

Rosaceae バラ科

Prunus incisa Thunb. var. *kinkiensis* (Koidz.) Ohwi

f. *plena* (Satomi) Sugimoto ヤエノキンキマメザクラ

福井市大芝山 1970. 5/3

キンキマメザクラの八重咲のもの。

Leguminosae マメ科

Desmodium racemosum DC. f. *albiflora* Tuyama シロバナヌスビトハギ

大野市中島 1971. 9/5

ヌスビトハギの白花品。

Lespedeza cyrtobotrya Miguel var. *kawachiana* (Nakai) Ohwi カワチハギ

坂井郡丈鏡山 1972. 8/31 (10966)

マルバハギの枝および花部の毛の開出するもの。

Vicia bifolia Nakai ミヤマタニワタン

三の峯 1967. 8/19

小梗の基のある苞が宿存するもの。

本州(中部地方)に分布。

Wisteria brachybotrys Sieb. et Zucc. ヤマフジ

遠敷郡上中町 1969. 7/6 (9320)

小葉数が少なく、葉の裏に伏毛がある。本州(西部)、四国、九州に分布。

Oxalidaceae カタバミ科

- Oxalis acetosella* Linn. var. *vegeta* Tatewaki エゾミヤマカタバミ
大野市刈込池付近 1972. 9/24
コミヤマカタバミの大形のもの。
北海道(西部)、本州、朝鮮に分布。

Anacardiaceae ウルシ科

- Rhus japonica* Linn. var. *toyohasiensis* Hayashi ハネナシヌルデ
坂井郡丈鏡山 1972. 6/22
ヌルデの葉軸に翅がないもの。本州(愛知、石川)

Aquifoliaceae モチノキ科

- Ilex geniculata* Maxim. var. *glabra* Okuyama オクノフウリンウメモドキ
勝山市取立山 1967. 8/9
フウリンウメモドキの葉裏に毛のないもの。北陸以東の日本海側に分布。

Celastraceae ニシキギ科

- Euonymus oxyphyllus* Miq. var. *magnus* Honda エゾツリバナ
大野市経ヶ岳 1970. 6/28 (10128) 坂井郡丈鏡山 1972. 6/11
ツリバナの葉の大きい型で、奥地のツリバナはこれに属すると考えられる。
北海道、本州(日本海側)

Aceraceae カエデ科

- Acer mono* Maximowicz var. *glabrum* (Lév. et Vnt.) Hara エゾイタヤ
遠敷郡名田庄村 1967. 8/24 上中町河内 1971. 9/24 (11694)
北海道、本州(奥羽、北陸)、朝鮮、アムール
var. *mayrii* (Schwer.) Koidz. ex Nemoto アカイタヤ
敦賀市岩籠国有林 1966. 9/23 黒河 1971. 8/17 (11279)
大野市三の峯 1972. 7/9 (10867)
北海道から東北地方、北陸、近畿の日本海側の山地に分布。
var. *savatieri* (Pax) Nakai モトゲイタヤ
大飯郡高浜町 1970. 5/29 (10315) 三方郡三方町御神島 1972. 7/15 (10825)

Guttiferae オトギリソウ科

- Hypericum kamtschaticum* Ledeb. イワオトギリ
三の峰 1970. 7/26 (10452). 1972. 7/8 (10842)

北海道、本州（北中部）に分布。

シナノオトギリに似ているが、葉に黒点のみつく。

Hypericum pseudopetiolum R. Keller

var. *muraianum* (Makino) Y. Kimura イワテオトギリ

勝山市鉢伏山 1968. 8/1 (7046)

サワオトギリの葉には一面に明点があり、ふちにだけ黒点があるが、本種は一面に黒点がある。

Violaceae スミレ科

Viola verecunda A. Gray var. *fibrillosa* Ohwi ミヤマツボスミレ

荒島岳 1968. 6/2 冠山 1972. 5/7 (10790)

ツボスミレの高山型。

Viola gryoceras A. Gray var. *gryoceras*

f. *hosoi* (Nakai) F. Maekawa ホソイスマレ

大野市六呂師 1972. 5/3 (9980)

葉のへりのきょ歯がいちぢるしい型。

Stachyuraceae キブシ科

Stachyurus paraecox Sieb. et Zucc. var. *matsuzakii* (Nakai) Makino

ナンバンキブシ

高浜町青葉山 1969. 6/29 (9144) 高浜町音海 1970. 5/29 (10318)

海岸にはえて枝が太く、葉も大きく、果の長さが10～15mmのもの。

本州（関東以西）、四国、九州琉球に分布。

Onagraceae アカバナ科

Epilobium fastigiato-ramosum Nakai エダウチアカバナ

大野市温見 1972. 8/2 (10932, 10933)

北海道に分布。

Epilobium pyrriholophum Franch. et Savat. var. *curvatopilosum* Hara

ムツアカバナ

経ヶ岳 1970. 10/3 三の峯 1972. 9/23 (9746)

温見 1972. 8/2 (10937)

茎は屈毛だけのもの。

本州、九州、北海道、南千島に分布。

Araliaceae ウコギ科

Dendropanax trifidus (Thunb.) Makino カクレミノ

大飯郡本郷町 1970. 8/28 (10107)

関東以西の本州、四国、九州に分布。

Panax japonicus C. A. Mey form. *dichrocarpus* Nakai ソウシショウニンジン

高浜町 1971. 9/12 (11832)

果実の先端が黒くなるもの。

Diapensiaceae イワウメ科

Shortia soldanelloides Makino var. *magna* Makino

form. *invea* Sugimoto

シロバナオオイワカガミ

福井市国見岳 1971. 4/29

Ericaceae ツツジ科

Enkianthus campanulatus (Miq.) Nichols.

var. *palibinii* (Craib.) Bean

ベニサラサドウダン

三の峯 1970. 7/26

1972. 7/8 (10851. 10868)

本州(関東、北陸)に分布。

Rhododendron × *tectum* Koidzumi

ミヤコツツジ

モチツツジ × ヤマツツジ

遠敷郡名田庄村 1971. 5/16 (11206)

本州(静岡県以西)、四国に分布。

Rhododendron wadanum Makino

トウゴクミツバツツジ

大野市平家岳 1971. 7/23 (11363)

本州(宮城県以南、関東、長野、岐阜県以南、鈴鹿山脈まで)

Vaccinium yatabei Makino

アオジクスノキ

大野市三ツ子石山 1967. 10/9

勝山市大長山 1968. 7/19 (7113) 1971. 8/10 (11340)

本州(中部)の温帯上部～亜高山帯に分布。

Buddlejaceae フジウツギ科

Buddleja japonica Hemsl.

フジウツギ

遠敷郡名田庄村 1968. 10/3

本州(兵庫県以东……太平洋側)、四国に分布。

Gentianaceae リンドウ科

Halenia corniculata Cornaz

ハナイカリ

大野市三の峯 1967. 8/19

Boraginaceae ムラサキ科

Trigonotis brevipes (Maxim.) Maxim.

var. *coronata* (Ohwi) Ohwi コシジタビラコ

県内のミズタビラコはみなこの型に属するようである。

上中町河内 1969. 6/22 (9045), 大野市倉又山 1971. 7/31 (11417), 蠅帽子川
1971. 9/5 (11730), 経ヶ岳 1970. 6/28 (10223), 敦賀市黒河 1971. 8/17 (11256)
本州(近畿、北陸地方)に分布。

Labiatae シソ科

Prunella vulgaris Linn. var. *aleutica* Fern. ミヤマウツボグサ

勝山市取立山 1971. 8/10 (11348)

中部地方以北に分布。

Solanaceae ナス科

Solanum megacarpum Koidzumi オオマルバノホロシ

敦賀市池の河内 1962. 8/12 坂井郡芦原町 1972. 5/

中部地方以北に分布。

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科

Pedicularis resupinata Linn. form. *albiflora* Hara シロシオガマ

大野市三の峯 1971. 8/7

シオガマガクの白花品。

Veronica japonensis Makino var. *occidentalis* Murata ニシノヤマクワガタ

遠敷郡名田庄村 1971. 5/16 (11200) 1971. 7/10 (11994)

博物館には堀先生が1958. 8/19に採集した標本があったが、同定してなかったので、ここに
書きました。本州(近畿地方以西)に分布。

Rubiaceae アカネ科

Paedria scandens (Lour.) Merr.

var. *longituba* (Nakai) Hara ツツナガイイトバナ

福井市足羽山 1972. 8/29 坂井郡丸岡町竹田 1972. 8/31

花筒が細く長い。本州、九州に分布。

var. *maritima* (Koidz.) Hara ハマサオトメカズラ

大飯郡高浜町 1972. 8/25 丹生郡越前町 1972. 10/25 (12149)

葉は厚く光沢があつて毛がない。

本州、四国、九州、中国の海岸地方に分布。

Caprifoliaceae スイカズラ科

Linnaea borealis Linn. リンネソウ

大野市三の峯 1967. 8/19

西限産地である。

Viburnum sieboldii Miguel

var. *obovatifolium* Sugimoto マルバゴマギ

足羽郡美山村 1968. 6/ 大野市三の峯 1960. 7/27

嶺北のゴマギはこの型にはいると思われる。北陸地方から東北地方に分布。

Abelia spathulata Siebold et Zuccarini var. *stenophylla* Honda

ウゴツクパネウツギ

坂井郡芦原町 1972. 4/29 (9772)

敦賀市白木 1970. 5/27 (10430)

東北地方から北陸地方に分布。

Viburnum wrightii Miguel form. *eglandulosum* Hiyama ホシナンミヤマガマズミ

勝山市小原峠 1967. 6/18

今立郡部子山 1968. 7/25

葉の裏に腺点のないもの。

Compositae キク科

Crassocephalum crepidioides S. Moore ベニバナボロギク

福井市足羽山 1966. 8/29

遠敷郡名田庄村 1967. 8/24

敦賀市黒河国有林 1971. 8/16

帰化植物

Ixeris dentata Nakai var. *Kimurana* Ohwi クマモリガナ

勝山市大長山 1968. 7/19

三の峯 1971. 8/7 (11475) 1972. 7/8 (10847)

中部地方以北、北海道に分布。

Leontopodium japonicum Miguel var. *shiroumense* Nakai ミネウスユキソウ

大野市三の峯 1971. 8/7

頭花が集合して花柄をもたない型 三の峯のウスユキソウはこの型である。

Siegesbeckia orientalis Linn. ツクシメナモミ

福井市大丹生～大味 1972. 10/1 (12062)

本州(関東南部以西)、四国、九州、台湾、中国、マレーシア等に分布。

Taraxacum alpicola Kitamura ミヤマタンポポ

大野市三の峯 1967. 8/19 1972. 7/8 本州(中部地方)に分布。

Taraxacum pectinatum Kitamura クシバタンボボ

三方郡三方町常神半島

大野市南六呂師 1972. 5/3

本州(北陸, 近畿)、四国に分布。

Hypochoeris radicata Linn. ブ タ ナ

丸岡町小黒 1970. 7/4 (長畝小学校科学クラブ採集)

遠敷郡上中町放牧場 1971. 9/26 (11895)

帰化植物

Lactuca sororia Miq. var. *pilipes* (Migo) Kitamura ケムラサキニガナ

今立町柳の滝 1961. 7/16 (6569)

花柄に腺毛のあるもの。

Gramineae イネ科

Cinna latifolia Grisebach フサガヤ

三の峯 1971. 8/7 (11464)

北海道、本州の深山に生育。

Cyperaceae カヤツリグサ科

Carex blepharicarpa Franchet var. *dueensis* Akiyama タカネショウジョウスゲ

三の峯 1970. 7/27

Carex insanae Koidz. form. *angustifolia* Akiyama コヒロバスゲ

福井市殿下 1968. 5/26 (5807)

Carex jacens C. B. Clarkei ハガクレスゲ

勝山市大長山 1967. 6/18 (5789)

本州(中北部)、北海道、南千島に分布。

Carex limosa Linn. ヤチスゲ

大野市赤兎山 1968. 8/19

本州(兵庫県以東)、北海道等、周極地域の高層湿原に生育。

Carex mertensii Presc. var. *urostachys* Kükenth. キンチャクスゲ

三の峯 1966. 8/10

本州(日本海側)、北海道の温帯上部に分布。

Carex morrowii Boott カンスゲ

敦賀岩籠国有林 1967. 4/30

大野郡和泉村面谷 1969. 5/3

本州、四国、九州に分布。

Carex parciflora Boott var. *vaniotii* Ohwi ナガボノコジュズゲ

勝山市小原峠 1967. 6/18 大長山 1967. 6/18 (5787)

大野市三の峯 1971. 8/7 (11487)

本州の温帯上部に分布。

Carex pyrenaica Wahlenb キンスゲ

大野市三の峯 1970. 7/26

本州(富山県、長野県以東)、北海道に分布。

Glyceria leptorrhiza Maximowicz var. *infima* (Ohwi) Ohwi ウキガヤ

大野市本願清水 1971. 6/4 (10754)

本州、北海道に分布。

Scripus hondoensis Ohwi ミヤマホタルイ

勝山市取立山 1967. 8/9

大野市赤兎山 1967. 10/9 (7019) 1968. 7/19

大野市経ヶ岳 1969. 7/21

本州(中部地方, 奥羽地方の日本海よりの高山)に分布。

Juncaceae イグサ科

Luzula pallescens (Wahlenb) Besser オカスズメノヒエ

池田町冠山 1969. 5/25 (9599) 部子山 1968. 7/25 (7031)

西日本の高い山に生育。

Iridaceae アヤメ科

Iris laevigata Fischer form. *albopurpurea* Makino シロカキツバタ

勝山市六呂師 1971. 6/4 (11496)

Orchidaceae ラン科

Bulbophyllum inconspicuum Maxim. ムギラン

遠敷郡名田庄村 1971. 8/23 (11630)

本州(関東地方以西)、四国、九州に分布。

Dactyloctenium ringens Reichb. fil. イチョウラン

今立郡冠山 1969. 5/25 (下道治)

遠敷郡名田庄村 1971. 5/ (11095) (上坂正夫)

北海道、本州、四国に分布。

Listera nipponica Makino ミヤコフタバラン

大野市平家岳 1972. 8/5 (12090)

北海道、本州(中部地方以北)、四国(東赤石山)、九州(祖母山)に分布。

以上、福井県に初記録と思われるものについて記しました。

尚、標本については、北村四郎先生、倉田悟先生、村田源先生、奥山春季先生、田村道夫先生、橋本保先生に見ていただきました。記して謝意を表します。

羽水高等学校教諭