

福井県の甲虫 (2)

井崎市左エ門

本目録を作るに当り、採集品を御寄贈下さいました左記の方の御芳名を記して感謝の意を表します。若狭高灰堀口寿雄氏、敦賀高灰竹中澤三氏、小浜中学校岡本源三助氏、福井市成和中学校堅部昭三氏、吉田艶子氏、吉村賢氏、福井旭小学校三村十左雄氏、荒川九兵衛氏、丸岡高専学校高原源三氏、武生高灰福島一弥氏、尚志寮については黒野義一氏、和名の新橋は五木大学助教授中根徳彦氏の命名

昨年九月蕨葉系のフクモンフクタマコメソキが採集出来た。今後、南方系、北方系等発見されて行くと思われる。

PORYPHAGA - MACRODACTYLI 大趾類

Dryopidae どりむし科

- | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 120 | <i>Mataeopsephenus japonicus</i> | Matsumura | ヒラタドロムシ | 遷教、六呂師(坪田) |
| 121 | <i>Stenelmis foveicollis</i> | Schönfeldt | キスジナガドロムシ | 遷教 |

PORYPHAGA - FOSSIPEDES 大基筒類

Dascillidae ながはなのみ科

- | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 122 | <i>Epilichas flabellatus</i> | Kiesenwetter | エダヒケナガハナノミ | 下根来 |
| 123 | <i>Drupeus villipennis</i> | Lewis | タテスジヒケナガハナノミ | 磯カ湯 |

両種共に黒色で、筒角は節齒状、草葉の上にて得られる。

Helodidae まるはなのみ科

- | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------------|-----|
| 124 | <i>Helodes flavicollis</i> | Kiesenwetter | ギムネマルハナノミ | 遷教 |
| 125 | <i>Scirtes japonicus</i> | Kiesewetter | トビイロマルハナノミ | 磯カ湯 |

各種の危にあまり近づくと筒に飛ぶ、成虫にて樺等の樹皮下に越冬する

POLYPHAGA - STERNOXIA 尖筒板類

Buprestidae たまむし科

- | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|------------|--------|
| 126 | <i>Trachys robusta</i> | Saunders | サシゲチビタマムシ | 遷、飛 |
| 127 | <i>Trachys griseofasciata</i> | Saunders | ナミガタチビタマムシ | 阪谷(坪田) |
| 128 | <i>Trachys indita</i> | Saunders | アカガネチビタマムシ | 遷、教 |

- 129 *Trachys minuta* Linné ヤナギチビタマムシ 遠 敷
 130 *Trachys saundersi* Lewis サウンダーズチビタマムシ 鬼カ谷
 131 *Trachys tringoi* Kurosawa ボケチビタマムシ 遠 敷

上記の六種は、小形にて稍円味を帯び、4-6月頃草の間を乱獲して採集出来る。

- 132 *Agrilus cyaneoniger* Saunders クロナガタマムシ 鬼カ谷、鳩カ湯
 133 *Agrilus lewisiellus* Kerremans ホンアシナガタマムシ 鬼カ谷
 134 *Agrilus discalis* Saunders ヒシモンナガタマムシ 鬼カ谷

全体褐色で、翅の中央部に濃褐色の菱形紋が有るので他の種類と区別が出来る。

三種共に4-6月頃、山間の草、木の葉上にて採集出来る。

- 135 *Agrilus lewisiellus* Kerremans ホンアシナガタマムシ 鬼カ谷
 136 *Agrilus spinipennis* Lewis ケマキナガタマムシ 石徹白、福井
 137 *Coraebus quadriundulatus* Motsulsky シロオビナガタマムシ 鳩カ湯、鬼カ谷
 138 *Buprestis haemorrhoidalis japonensis* Saunders クロタマムシ 福井(土肥)
 139 *Chalcophora japonica* Gory ウバタマムシ 小浜市熊野 (小中平田)
 足羽山 (土肥)

この科中大形種で、余り美しくない。一般にタマムシの♀と思われるが別種である。

- 140 *Chalcophorella querceti* Saunders クロマダラタマムシ 厨 (林正之)
 141 *Chalcophorella amabilis* Snellen van Vollenhoven アオマダラタマムシ
 織田(林) 敦賀(気比中)

前記二種共に中形の美麗種で、よく似て居るが、前者の方が少し巾が広い様である。

- 142 *Chrysobothris ohbayashii* オオバヤシムツボシタマムシ 越前町厨(林正之)
 143 *Chrysobothris succedania* Saunders ムツボシタマムシ 織田(林)
 両種共に翅鞘に六ヶの紋があるが、後者の方が遙に小さい。

- 144 *Anthaxia proteus* Saunders ミドリヒメヒラタマムシ
 厨(林) 敦賀(西野一朗)

緑黒の細長い微小種である。

- 145 *Chrychroa fulgidissima* Schönherr タマムシ 小浜市厨中(若高小田)
 小浜(小浜中畑中)

緑色の翅に紅色の縦斑が有る美麗種で、法隆寺の玉虫の厨子は世人のよく知るところである。美しいので鏡台の引出しに入れて保存する婦人もある。

Erateridae こめつきむし科

- 146 *Lacon binodulus* Motschulsky サビキコリ 鳩カ湯

- 147 *Lacon fuliginosus* Candéze ホソサビキコリ 鬼カ谷、小沢(若面長谷川)
四月頃より草間に採集出来るが、両翅共に光沢が無い。
- 148 *Alaus berus* Candéze フバタマコメツキ 遠敷
大形のコメツキで、四月頃から現われて、夏迄見られるが稀である。
- 149 *Alaus putridus pini* Lewis フタモンフバタマコメツキ 遠敷
前胸背に皺に隆起があり、翅鞘中央の両側に黒褐斑がある。熱帯系のもので、本県では31年9月6日燈火に飛来して一匹採集出来ただけである。
- 150 *Tetrigus lewisi* Candéze オオクシヒゲコメツキ 鳩カ湯
- 151 *Pectocera fortunei* Candéze ヒゲコメツキ 永平寺、平康寺
赤褐色で白紋があり、その隅角は大形で体長に近い長さがある。
- 152 *Aetoderma agnata* Candéze マダラチビコメツキ 飯谷(坪田)
- 153 *Elator hypogastricus* Candéze アカハラクロコメメキ 鬼カ谷
- 154 *Elator evanovi* Jacobson コクロコメツキ(新稱) 鬼カ谷
- 155 *Elator carbunculus* Lewis チビクロコメツキ(新稱) 鳩カ湯
前記三種は4-6月頃、山間の種々の花にて採集出来る。
- 156 *Parardiophorus pullatus* Candéze コハナコメツキ 鳩カ湯
- 157 *Spheniscosmos cete* Candéze アカアシオオクシコメツキ 鳩カ湯、遠敷
- 158 *Spheniscosmos restrictus* Candéze オオクシコメツキ 鬼カ谷
- 159 *Melanotus legatus* Candéze クシコメツキ 小沢、遠敷
- 160 *Melanotus annosus* Candéze トビイロクシコメツキ 遠敷
- 161 *Melanotus senilis* Candéze クロクシコメツキ 鳩カ湯、鬼カ谷
- 162 *Melanotus erythropygus* Candéze コカタノクシコメツキ 鬼カ谷、遠敷
- 163 *Athous umbratilis* Lewis オオツヤハダコメツキ 鳩カ湯
- 164 *Athous secessus* Candéze クロツヤハダコメツキ 小池
- 165 *Athous praenobilis* Lewis ルリツヤハダコメツキ 小池
- 166 *Corymbites pruinosus* Motschulsky シモフリコメツキ 鬼カ谷
中形種で褐色に白点がある。四月頃晴天に飛来する。
- 167 *Corymbites aerosus* Lewis ヒメドウガネヒラタコメツキ(新稱)
小沢市神宮寺、羽賀
- 168 *Corymbites notabilis* Candéze オオヒラタコメツキ 栗野(敦南昆虫班)
- 169 *Corymbites gratus* Lewis ドウガネヒラタコメツキ 神宮寺、小沢市門前
- 170 *Corymbites puerilis* Candéze シリアトヒラタコメツキ 門前
- 171 *Ludius sieboldi* Candéze オオナガコメツキ 丹生白山(白山中盤出)、鳩カ湯
- 172 *Neotrichophorus plebejus* Candéze コナガコメツキ 遠敷、鳩カ湯

- 173 *Agriotes sericeus* Candéze カバイロコメツキ 柿宮寺
 174 *Agriotes laucophaeatus* Candéze ヨツモンムナボソコメツキ (新稱) 鬼カ谷
 175 *Agonischius gracilis* Candéze キバネホソコメツキ 鳩カ湯, 羽賀

上記のコメツキ類は前胸と腹部で屈曲するので、タマムシ類と区別出来る。

Denticollis ベにこめつき科

- 176 *Denticollis miniatus* Candéze ベコメツキ 鳩カ湯
 前科の瘦瘠に似て、翅鞘は赤褐色。5-8月頃山地の草間に居るが少ない。

Melasidae つめつきだまし科

- 177 *Fornax victor* Fleutiaux オオチマイロコメツキダマシ 鳩カ湯

POLYPHAGA - TELEDILIA 木蠹類

Lymexylonidae つつしんくい科

- 178 *Hylecoetus* sp. ツツシングイの一種 鳩カ湯
 179 *Dinoderus japonicus* Lesne ニホンタケナガシングイ 遠 敷
 180 *Heterobostrychus hamatipennis* Lewis オオナガシングイ 遠 敷

PORYPHAGA - HETEROMERA 異節類

Tenebrionidae こみむしだまし科

- 181 *Gonocephalum coriaceum* コスナゴミムシダマシ 鳩カ湯 一乗谷(坪田)
 182 *Gonocephalum sexuale* Marseul ホンスナゴミダマシ 鳩カ湯
 183 *Heterotarsus carinula* Marseul スジスナゴミムシダマシ 鳩カ湯
 184 *Diaperis Cawisi* Bates モンキゴミムシダマシ 鳩カ湯
 185 *Ceropria induta* Wiedemann ナガニジゴミムシダマシ 鳩カ湯
 186 *Vloma bonzica* Marseul ヨツゴフゴミムシダマシ 鳩カ湯
 187 *Vloma* sp. エクリゴミムシダマシ 六名師(坪田)
 188 *Tenebrio obscurus* Fabricius ゴメノゴミムシダマシ 遠 敷

黒色にて此科中大形の方。体扁平で夏期水の中に居る。

- 189 *Neatus picipes* Herbst ゴミムシダマシ 鳩カ湯 遠 敷
 190 *Luprops sinensis* Marseul ヒゲストゴミムシダマシ 遠 敷

薪の下に多く、黒褐色の普通種である。

- 191 *Menephilus arciscelis* Marseul クロツヤホソゴミムシダマシ 遠 敷
 192 *Tetraphyllus lunuliger* Marseul ニジゴミムシダマシ 鳩カ湯

小形で、テントウムシに似て黒く、光棘の工合で虹の様な光沢が現われる。

- 193 *Elixota curva* Marseul コマルキマワリ

- 194 *Tarpela cordicollis* Lewis マルムネゴシムシタマシ 鬼カ谷
- 195 *Strongylium japonum* Marseul シワナカキマフリ 遠 敷
黒緑色で光沢があり、翅に縦糸がある。南方系のもので、本県では少ない。
- 196 *Ainu tenuicornis* Lewis ホソヒゲナカキマフリ 鳩カ湯
北方系のもので、鳩カ湯以外では見付らぬらしい。
- 197 *Plesiophthalmus nigrofasciatus* Motschulsky キマフリ 鳩カ湯、小舟渡
- 198 *Tribolium ferrugineum* Fabricius コクヌストモドキ 遠 敷
穀物の害虫として有名である。赤褐色扁平の小形種で発生は多い。

Lagriidae はむしだまし科

- 199 *Lagria nigricollis* Hope ハムシタマシ 和泉村大谷
- 200 *Nemostira rufobrunnea* Marseul ナガハムシタマシ 鳩カ湯
- 201 *Arthramacra viridissima* Lewis アオハムシタマシ 鬼カ谷、遠敷

Alleculidae くちぎむし科

- 202 *Allecula fuliginosa* Mäklin オオクチキムシ 栗野(敦高昆虫班)
- 203 *Allecula melanaria* Mäklin クチキムシ 遠 敷
- 204 *Allecula bilamellata* Marseul クリイロクチキムシ 鳩カ湯
- 205 *Allecula simiola* Lewis ヒメクリイロクチキムシ(新種) 鳩カ湯
- 206 *Hymenalia rufipennis* Marseul var? アカハネヒメクチキムシ 栗野 鬼カ谷
- 207 *Otenoporus hypocrita* Marseul キイロクチキムシ 遠 敷
黄褐色で脚が長い。6-9月頃燈火に飛来する。
- 208 *Isomira oculata* Marseul フナカタクチキムシ 鬼カ谷、鳩カ湯
以上の種類は朽木に集まり、又燈にも来る。

Oedemeridae かみきりもとき科

- 209 *Xanthochroa waterhousei* Harold アオカミキリモドキ 鳩カ湯
- 210 *Xanthochroa hilleri* Harold キイロカミキリモドキ 鬼カ谷
- 211 *Xanthochroa luteipennis* Marseul キバナカミキリモドキ 鳩カ湯
- 212 *Asclera nigrocyanea* Lewis カミキリモドキ 鬼カ谷
- 213 *Oncomera venosa* Lewis マタラカミキリモドキ 鬼カ谷
- 214 *Oncomera lucidicollis* Motschulsky モモフトカミキリモドキ 鬼カ谷
- 215 *Oncomera manicata* Lewis キアシカミキリモドキ 鬼カ谷、遠敷

Serropalpidae ながくちぎむし科

- 216 *Penthe japana* Marseul モンキナグチキムシ 鳩カ湯
- 217 *Synchroa crepuscula* Lewis コメツキカタナグチキムシ 鳩カ湯

(時)

- 218 *Dircaeomorpha erotyloides* Lewis キノコナガクチキムシ 鳩カ湯
219 *Serropalpis niponicus* Lewis キムロボソナガクチキムシ 鳩カ湯

Cephaloidea くびながむし科

- 220 *Cephaloon pallens* Motschulsky クビナガムシ 遠 敷
山地の花上の見られ、色彩の变化多く黄褐色、黒褐色等がある。

Mordellidae

- 221 *Mordellistena pumila* Gyllenbal クロヒメハナノミ 尾カ谷
222 *Mordellistena fujiyamai* Nomura コクロヒメハナノミ 遠 敷
二種共に黒色小形種で山地の花上にて得られるが稀、跳躍する。

Rhipiphoridae おおはなのみ科

- 223 *Macrosiagon bipunctatum* Fabricius フタオビオオハナノミ 口名田(近着)
花蚤の中では稍大形、本県では稀らしく、昭和九年に故近着繁氏が一匹を採集したのみで、其後発見せらぬらしい。

Meloidae つちはんみよう科

- 224 *Meloi corvinus* Marseul クルクビツチハンミョウ 遠 敷
225 *Meloi auriculatus* Marseul ヒメツチハンミョウ 遠 敷

Epicautidae まめはんみよう科

- 226 *Epicauta gorhami* Marseul マメハンミョウ 大呂師(坪田)
数頁(或高昆虫班)

背面に黄條のあるのが普通なるも、黒化型も捕れる。

Pyrochroidae あかはんむし科

- 227 *Pseudopyrochroa vestiflua* Lewis アカハネムシ 尾カ谷
228 *Pseudopyrochroa aurita* Lewis アナアカハネムシ 尾カ谷

5-7月頃山中の草木の花上で得られる

PORYPHAGA - RHYTOPHAGA 食葉類

- 229 *Syneta adamsi* Baly ホソスケハムシ 相宮寺
230 *Lema honorata* Baly ヤマイモハムシ 鳩カ湯 上志比(土肥)
231 *Lema diversa lewisi* Baly ツマキクビボソハムシ 和泉村大谷
232 *Lema puncticollis* Curtis アザミクビボソハムシ(改稱) 鳩カ湯
233 *Lema colonata* Baly トゲアシクビボソハムシ 丸岡(丸岡高次)
234 *Lema oryzae* Kuwayama イネクビボソハムシ 遠 敷

235	<i>Crioceris subpolita</i> Motschulsky	アカクビナガハムシ	鬼カ谷
236	<i>Crioceris rugata</i> Baly	キイロクビナガハムシ	鬼カ谷
237	<i>Crioceris lewisi</i> Jacoby	ルイスクビナガハムシ	鬼カ谷
238	<i>Clytra caeviuscula</i> Ratzeburg	ヨツボシサルハムシ	下根来
239	<i>Cryptocephalus approximatus</i> Baly	バラルリサルハムシ	羽 賀
240	<i>Cryptocephalus instabilis</i> Baly	コヤツボシサルハムシ	羽賀 遠敷
241	<i>Cryptocephalus sexpunctata</i> Linné	ムツボシサルハムシ	遠 敷
242	<i>Cryptocephalus bilineatus</i> Linné	フタスジサルハムシ	遠 敷
243	<i>Chlamius spilota</i> Baly	ムシクソハムシ	遠 敷
244	<i>Lamprosoma cupreatum</i> Baly	ドウガネツヤハムシ	
245	<i>Lamprosoma nigrocoeruleum</i> Baly	アオドウガネツヤハムシ (新種)	遠敷, 神宮寺
246	<i>Basilepta fulvipes</i> Motschulsky	アオバネサルハムシ	和泉村大谷, 遠敷
247	<i>Lypesthes ater</i> Motschulsky	リンゴコフキハムシ	鬼カ谷
248	<i>Trichochrysea japana</i> Motschulsky	トビサルハムシ	神宮寺
249	<i>Acrothium gaschkewitschii</i> Motschulsky	アカガネサルハムシ	遠 敷
250	<i>Colasposoma dauricum</i> Mannerheim	イモサルハムシ	鬼カ谷
251	<i>Chrysolina aurichalcea</i> Mannerheim	ヨモギハムシ	鬼カ谷, 鳩カ湯
252	<i>Chrysolina exanthematica</i> Wiedemann	ハツカハムシ	福井 (増田)
253	<i>Phaedon bracciae</i> Baly	ダイゴンサルハムシ	淨法寺 (坪田)
254	<i>Chrysomela aenea</i> Linne	ルリハムシ	鳩カ湯, 下根来
255	<i>Chrysomela vigintipunctata</i> Scopoli	ヤナギハムシ	鬼カ谷, 遠敷
256	<i>Chrysomela populi</i> Linne	ドロノキハムシ	下根来 下宇坂 (坪田)
257	<i>Gastrolina thoracina</i> Baly	クルミハムシ	鳩カ湯
258	<i>Gastroidea atrocyanea</i> Motschulsky	コガタノルリハムシ	神宮寺, 下根来
259	<i>Plagioderia versicolora distincta</i> Baly	ヤナギルリハムシ	門前, 遠敷
260	<i>Lochmaea capreae</i> Linné	スジクロアラメハムシ	鬼カ谷
261	<i>Lochmaea semifulva</i> Jakoby	アカタデハムシ	遠敷, 羽賀
262	<i>Galerucella maculicollis</i> Motschulsky	ニレハムシ	鬼カ谷
263	<i>Phytodecta rubripennis</i> Baly	フジハムシ	鬼ヶ谷, 遠敷

前胸は黒褐色で翅鞘は赤い。萱科植物に多い。

264	<i>Ceratia nigripennis</i> Motschulsky	クロウリハムシ	鬼カ谷
265	<i>Auracophora femoralis</i> Motschulsky	ウリハムシ	遠 敷

両種共に有名な風の害虫で黄褐色。前者は翅鞘は黒い。

266	<i>Paraulaca quabriplagiata</i> Baly	ヨツボシハムシ	鬼カ谷, 吉崎 (坪田)
267	<i>Paraulaca augulicollis</i> Motschulsky	アトボシハムシ	遠敷, 加ア (坪田)

268	<i>Cerophysa tibialis</i> Iacoby	クロバキイロハムシ(新稱)	鳩カ湯
269	<i>Fleutiauxia armata</i> Baly	クワハムシ	鬼カ谷
270	<i>Lirætis coeruleipennis</i> Weise	ルリバネウスバハムシ(新稱)	羽實
271	<i>Clerotiria flavomarginata</i> Iacoby	キアシヒゲナガアオハムシ	(鳩カ湯)
272	<i>Agelastica coerulea</i> Baly	ハンノキハムシ	鳩カ湯
273	<i>Luperus japonicus</i> Fleischer	ハラグロヒメハムシ	鬼カ谷
274	<i>Luperus flaviventris</i> Motschulsky	キバラヒメハムシ	遠 敷
275	<i>Hesperomorpha hirsta</i> Iacoby	ケブカクロナガハムシ	遠 敷
276	<i>Luperodes menetriesi</i> Faldermann	ワリハムシモドキ	鳩カ湯
277	<i>Monolepta dichroa</i> Harold	ホタルハムシ	鬼カ谷
278	<i>Sphaeroderma fuscicornis</i> Baly	キイロタマノミハムシ	遠・敷
279	<i>Sphaeroderma placide</i> Harold	キムネクロノミハムシ	丸岡高
280	<i>Arthrolus niger</i> Motschulsky	ムナクロツヤハムシ	鬼カ谷, 遠敷
281	<i>Galerucida bifasciata</i> Motschulsky	イタドリハムシ	遠敷, 鬼カ谷
282	<i>Norarthra cyaneum</i> Baly	ルリマルノミハムシ	神宮寺, 鬼カ谷
283	<i>Sangariota punctatostriata</i> Motschulsky	カククリハムシ	鬼カ谷
284	<i>Phygasia fulvipennis</i> Baly	チャバネトビハムシ(新稱)	鬼カ谷
285	<i>Haltica cyanea</i> Weber	カミナリハムシ	小沢(若高奇藤)
286	<i>Haltica viridicyanea</i> Baly	コカミナリハムシ	遠 敷
287	<i>Haltica latericosta</i> Iacoby	スジカミナリハムシ	遠 敷
288	<i>Argopus balyi</i> Harold	オオキイロマルノミハムシ	鬼カ谷
289	<i>Luperomorpha lunesta</i> Baly	クワノミハムシ	遠 敷
290	<i>Phyllotreta striolata</i> Fabricius	キスジノミハムシ	福 井
291	<i>Sebaethe plagioderoides</i> Motschulsky	ヒゲナガルリノミハムシ	遠 敷
292	<i>Dactylispa angulosa</i> Motschulsky	キベリトケトケ	下根末
293	<i>Dactylispa subquadrata</i> Baly	カタビロトケトケ	鬼カ谷, 遠敷
294	<i>Paraluperodes suturalis nigrolineatus</i> Motschulsky	フタスジヒメハムシ	遠 敷
295	<i>Aspidomorpha difformis</i> Motschulsky	ジンガサハムシ	遠敷, 淨法寺(坪田)
296	<i>Aspidomorpha transaripennis</i> Motschulsky	スキバジンガサハムシ	遠 敷
297	<i>Metriana thais</i> Boheman	セモンジンガサハムシ	遠 敷
298	<i>Metriana sigillata</i> Gorham	イカリヒメジンガサハムシ	神宮寺
299	<i>Thlaspidia japonica</i> Spaeth	イチモンジカメノコハムシ	遠 敷
300	<i>Cassida rubiginosa</i> Müller	アオカメノコハムシ	鬼カ谷, 遠敷
301	<i>Cassida nebulosa</i> Linné	カメノコハムシ	遠 敷
302	<i>Cassida japana</i> Baly	イノゴズチカメノコハムシ	福 井
303	<i>Cassida piperata</i> Hope	ヒメカメノコハムシ	福井 (藤島英 高橋恭雄)