

福井県産オサムシの分布資料(2)

長 田 勝*

前報(1979)につづき、1979年以降の採集記録を報告する。データの記述は採集地・標高・頭数・(採集法または採集時の生態)・採集年月日・採集者の順である。

報告にあたり標本を提供してくださった各位に厚くお礼申しあげる。なお、筆者の採集によるものは採集者名を省略した。

1. *Calosoma maximowiczii* (MORAWITZ) クロカタビロオサムシ

福井市四十谷町大安寺キャンプ場 alt. 40m 1♀ (歩行中) 3-VIII-1981; 同 alt. 50m 1♀ (歩行中) 10-VIII-1981

2. *Campalita chinense* (KIRBY) エゾカタビロオサムシ

坂井郡三国町池見 2♂1♀ (灯火) 27-VII-1982 齊藤昌弘採; 福井市大宮2丁目5-32 alt. 8m 1♂ (路上圧死体) 21-IX-1979; 福井市大手2丁目7-13栄月石油給油所前 1♂ (路上圧死体) 18-VII-1982

3. *Hemicarabus tuberculatus* (DEJEAN et BOISDUVAL) セアカオサムシ

福井市舟橋町九頭竜川左岸河川敷 14♂3♀ (トラップ) 30-IV~10-V-1981

4. *Ohomopterus dehaanii* (CHAUDOIIR) オオオサムシ

福井市文殊山 1♂ (歩行中) 20-V-1979 八木治久採; 吉田郡永平寺町諏訪間 alt. 70~80m 4♂4♀ (トラップ) 21~23-VII-1980; 吉田郡永平寺町鳴鹿 alt. 65~70m 1♀ (トラップ) 21~23-VII-1980; 吉田郡永平寺町栃原 alt. 80m 2♂1♀ (トラップ) 21~23-VII-1980; 武生市池ノ上 alt. 105~118m 2♂ (側溝歩行中) 23-V-1981; 今立郡池田町志津原 alt. 250m 3♂5♀ (2♂3♀テネラル) (トラップ) 15~16-VIII-1981; 今立郡池田町田代 alt. 400m 1♀ (トラップ) 15~16-VIII-1981; 大野市荒島岳・勝原スキー場ススキ群落 alt. 415m 1♂2♀ (トラップ) 23~24-VII-1979; 南条郡南条町西大道 alt. 100m 1♂ (路上圧死体) 28-V-1979

5. *Ohomopterus maiyasanus* (BATES) マヤサンオサムシ

* 福井市立郷土自然科学博物館

坂井郡金津町宮谷～笹岡 alt. 65m 1♂ (歩行中) 6-V-1979 ; 福井市四十谷町大安寺キャンプ場 alt. 45～65m 1♂1♀ (トラップ) 2～3-VIII-1981 ; 福井市文殊山 alt. 60m 1♀ (路上圧死体) 20-V-1979 ; 同 二上町八幡神社境内 alt. 20m 1♂ (黒色) (歩行中) 20-V-1979 ; 同 北山登山道 1♀ (歩行中) 9-V-1983 ; 吉田郡永平寺町諏訪間 alt. 70～80m 9♂11♀ (4♂テネラル) (トラップ) 21～23-VII-1980 ; 吉田郡永平寺町鳴鹿 alt. 65～70m 9♂15♀ (3♂テネラル) (トラップ) 21～23-VII-1980 ; 吉田郡永平寺町上浄法寺 alt. 80m 17♂30♀ (12♂テネラル) (トラップ) 21～23-VII-1980 ; 吉田郡永平寺町栃原 alt. 80m 24♂26♀ (20♂テネラル) (トラップ) 21～23-VII-1980 ; 勝山市赤兎山登山口～小原峠 alt. 950～1,120 m 1♀ (側溝歩行中) 16-IX-1981 吉田健治採 ; 武生市白崎 alt. 78m 1♂ (黒色) (側溝歩行中) 23-V-1981 ; 武生市池ノ上 alt. 105～118m 4♂6♀ (1♂1♀交尾中) (側溝歩行中) 23-V-1981 ; 今立郡池田町志津原 alt. 250m 2♂2♀ (2♂1♀テネラル) (トラップ) 15～16-VIII-1981 ; 今立郡池田町冠山 alt. 1,180～1,190 m 2♂2♀ (トラップ) 15～16-VIII-1981 ; 大野市上打波～鳩ヶ湯 alt. 490m 1♀ (路上圧死体) 16-VI-1981 ; 大野市荒島岳 alt. 415m 3♂, 同 alt. 515m 1♂2♀, 同 alt. 660～670m 2♂2♀, 同 alt. 800m 2♂, 同 alt. 850m 2♂3♀, 同 alt. 980m 1♂ (以上トラップ) 23～24-VII-1979; 大野郡和泉村上伊勢鎌原谷 上翅および前胸背板(ナガレヒキガエルの糞塊中より検出) 6-VII-1982 ; 南条郡南条町西大道 alt. 100m 4♀ (3♀黒色) (ひき肉トラップ) 28-V～2-VI-1979

6. *Ohomopterus yaconinus* (BATES) ヤコンオサムシ

福井市舟橋町九頭竜川左岸河川敷 22♂20♀ (トラップ) 30-IV～10-V-1981 ; 福井市南栖原町日野川左岸河川敷 alt. 6m 4♂1♀ (トラップ) 2～3-VIII-1981 ; 吉田郡永平寺町栃原 alt. 80m 2♀ (トラップ) 21～23-VII-1980

7. *Ohomopterus yamato* (NAKANE) ヤマトオサムシ

吉田郡永平寺町諏訪間 alt. 70～80m 1♂4♀ (トラップ) 21～23-VII-1980 ; 今立郡池田町志津原 alt. 250m 1♂1♀ (テネラル) (トラップ) 15～16-VIII-1981 ; 今立郡池田町田代 alt. 400m 1♀ (トラップ) 15～16-VIII-1981 ; 大野市荒島岳 alt. 515m 3♂5♀, 同 alt. 660～670m 1♂, 同 alt. 850m 2♀, 同 alt. 980m 2♀ (以上トラップ) 23～24-VII-1979 ; 大野郡和泉村上伊勢鎌原谷 ♀交尾器および前胸背板 (ナガレヒキガエルの糞塊中より検出) 6-VII-1982

8. *Apotomopterus porrecticollis* (BATES) アキタクロナガオサムシ

吉田郡永平寺町諏訪間 alt. 70～80m 1♂ (トラップ) 21～23-VII-1980 ; 武生市

池ノ上 alt. 105~118m 1♀ (側溝歩行中) 23-V-1981

9. *Carabus (Pentacarabus) harmandi* LAPOUGE ホソヒメクロオサムシ

今立郡池田町冠山峠~冠山 alt. 1,050~1,090m 1♀, 同 alt. 1,150~1,160m
1♂ (以上トラップ) 15~16-VIII-1981

10. *Carabus (Leptocarabus) procerulus* CHAUDOIR クロナガオサムシ

福井市武周ケ池 alt. 280m 1♀(テネラル) (路上死体) 21-VI-1981 ; 吉田郡
永平寺町諏訪間 alt. 70~80m 2♂2♀ (トラップ) 21~23-VII-1980 ; 吉田郡永平
寺町鳴鹿 alt. 65~70m 3♀ (トラップ) 21~23-VII-1980 ; 吉田郡永平寺町上浄法
寺 alt. 80m 1♂ (トラップ) 21~23-VII-1980 ; 吉田郡永平寺町栃原 alt. 80m
2♂5♀ (トラップ) 21~23-VII-1980 ; 今立郡池田町冠山峠~冠山 alt. 1,050~
1,090m 13♂23♀, 同 alt. 1,150~1,160m 3♂6♀, 同 alt. 1,180~1,190m
4♂7♀(1♀テネラル) (以上トラップ) 15~16-VIII-1981 ; 大野市刈込池 alt.
1,070m 3♂ (ブナ朽木中) 16-VI-1981 ; 大野市荒島岳 alt. 415m 1♀, 同
alt. 660~670m 1♂1♀, 同 alt. 850m 1♀(テネラル), 同 alt. 980m
1♂(テネラル), 同 alt. 1,520~1,523m 1♂ (以上トラップ) 23~24-VII-1979
; 南条郡今庄町岩谷~夜叉ケ池 alt. 500m 1♂1♀ (トラップ) 9~10-X-1982 ;
小浜市百里ケ岳 alt. 500m 4♂4♀ (トラップ) 18~19-VIII-1980

11. *Damaster blaptoides* (KOLLAR) マイマイカブリ

福井市四十谷町 alt. 30m 1♂ (路上死体) 2-VIII-1981 ; 吉田郡永平寺町鳴鹿
alt. 65~70m 1♂ (トラップ) 21~23-VII-1980 ; 今立郡池田町冠山峠 alt.
1,050~1,090m 2♂ (トラップ) 15~16-VIII-1981 ; 大野市荒島岳 alt. 415m
1♂, 同 alt. 660~670m 1♂1♀, 同 alt. 850m 1♂, 同 alt. 1,520~
1,523m 1♂2♀ (以上トラップ) 23~24-VII-1979

—短報—

クロカタビロオサムシ飼育の一観察

長 田 勝

1981年8月10日, 福井市四十谷町で路上を歩行中の1♀を採集した。この個体を, 砂を敷いた
(厚さ約5cm)容器でリングに蜂蜜を塗って餌とし, 水分の補給のためフィルムケースのふたに水
を含ませた脱脂綿をいれて飼育した。砂には時々霧吹きで湿り気を与えた。飼育期間中ほとんど砂