

ミヤマフキバツタ属 2 種の分布記録

長 田 勝*

福井県のミヤマフキバツタ属 (*Parapodisma*) は 5 種が知られている。2001年の資料収集活動の際、このうちの 2 種を採集しているため、手許にある他の標本と併せて記録しておく。

1. オマガリフキバツタ *Parapodisma tanbaensis* Tominaga et Kano

5 2 , 福井県三方郡三方町神子~常神, 16 . . 2001 長田 勝採集; 2 , 同, 6 . .
2001 長田 勝採集; 1 , 福井県小浜市門前の明通寺, 6 . . 1999 下野谷豊一氏採集 .

福井県では名田庄村佐野 (福井県, 1998), 高浜町音海 (福井県, 1985; 長田, 1986), 同青葉山 (福井県, 1985), 小浜市百里ヶ岳 (福井県, 1985), 三方町常神 (福井県, 1985) の記録がある。

三方町常神における採集記録は当時福井大学の学生であった細田和雄氏によるもので、本年7月中旬に常神半島を訪れた際は比較的多くの個体が見られた。雌雄とも後脚脛節基部にある白色部が他種にくらべ目立つように思われる。

本種は滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県にも分布しているが、福井県内の分布東限がどのあたりなのか興味もたれる。

2. ヤマトフキバツタ *Parapodisma yamato* Tominaga et Storozhenko

1 1 , 福井県大野郡和泉村荷暮, 1 . . 2001 長田 勝採集 .

次の標本は博物館協力員の下野谷豊一氏より頂戴したもので、採集者は不明である。

1 , 福井県大野郡和泉村箱ヶ瀬, 5 . . 1992

1 , 福井県大野郡和泉村上半原, 25 . . 1999

本種は近隣では岐阜県, 滋賀県に分布している。従来、福井県における産地は武生市中新庄の三里山 (長田・酒井, 1991) のみであったが、岐阜県境に近い和泉村に分布することが判明したので、今後は和泉村から三里山に至る地域での分布調査が期待される。

参 考 文 献

福井県自然環境保全調査研究会昆虫部会編 . 1985 . 福井県昆虫目録 .

1998 . 福井県昆虫目録 (第 2 版) .

*福井市自然史博物館 (〒918-8006 福井市足羽上町147)

長田 勝 . 1986 . 高浜町音海の直翅類 . ぱったりぎす ,(70):13-15 .

・酒井哲弥 . 1991 . 三里山でヤマトフキバツタを採集 . 福井虫報 ,(9):18 .

Tominaga, O. & Kano, Y. 1989 . A new *Parapodisma* species (Orthoptera : Catantopidae) from Japan . AKITU N.S., (102):1-10.

, S.Y. Stonozhenko & Kano, Y. 1996. Two new species and new subspecies of the genus *Parapodisma* (Orthoptera, Acrididae) from Japan. *Tettigonia*, 1(1) :1-23.




図 1 オマガリフキバツタ県内分布図




図 2 ヤマトフキバツタ県内分布図